HUBUNGAN PEMBERIAN ASI DINI DENGAN KEJADIAN ANGKA IKTERUS PADA BAYI BARU LAHIR DI RS PERTAMEDIKA KECAMATAN BAITURRAHMAN BANDA ACEH TAHUN 2026

Dr. Debi Novita Siregar, SST., S.Keb, Bdn, M.Kes, Nadia Ulfayani, Marlina, Marissa Amanda, Nova Fitria.

Jurusan Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.
Email : Nadiaulfayani@gmail.com

ABSTRAK

Kejadian Ikterus Neonatorum merupakan masalah yang paling sering ditemukan pada bayi baru lahir dalam minggu pertama kehidupan. Ikterus neonatorum secara klinis akan mulai tampak apabila jumlah bilirubin semakin menumpuk ditubuh sehingga menyebabkan bayi terlihat berwarna kuning pada skela dan kulit dengan kadar bilirubin darah 57mg/dll. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pemberian ASI dini dengan kejadian angka ikterus pada bayi baru lahir di RS Pertamedika Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Jenis penelitian ini survey analitik menggunakan desain cross sectional. Sampel adalah ibu *post partum* yang melahirkan tanggal 1 September – 20 September 2026 berjumlah 33 orang. Analisa data menggunakan *Chi Square*. Hasil penelitian di dapatkan dari 33 ibu *post partum* (100%), mayoritas bayi tidak mengalami ikterus sebanyak 26 bayi (78,8%) dan bayi yang mengalami ikterus sebanyak 7 bayi (21,2%). Dapat disimpulkan adanya hubungan pemberian ASI dini dengan kejadian angka ikterus pada bayi baru lahir.
Kata Kunci: *ASI Dini, Ikterus*, Bayi Baru Lahir

ABSTRACT

Neonatal jaundice is the most common issue encountered in newborns during the first week of life. Clinically, neonatal jaundice becomes apparent when bilirubin accumulates in the body, causing the infant's sclera and skin to appear yellow, with blood bilirubin levels reaching 5–7 mg/dL. The objective of this study was to determine the relationship between early breastfeeding and the incidence of jaundice in newborns at Pertamedika Hospital, Baiturrahman District, Banda Aceh. This study employed an analytical survey method with a cross-sectional design. The sample consisted of 33 postpartum mothers who gave birth between September 1 and September 20, 2026. Data analysis was performed using the Chi-Square test. The results showed that among the 33 postpartum mothers (100%), the majority of infants (26 or 78.8%) did not develop jaundice, while 7 infants (21.2%) did. It can be concluded that there is a relationship between early breastfeeding and the incidence of jaundice in newborns.
Keywords: Early Breastfeeding, Jaundice, Newborns