

ABSTRAK

Faozaro Lase, Pola Penyebaran Hama Kumbang Tanduk (*Oryctes rhinoceros*) Di TBM 1 Perkebunan PP London Sumatera Indonesia Tbk. Dibimbing oleh Julaili Imani, S. Si., M. Si.

Serangan hama kumbang tanduk jantan dan betina melakukan dengan cara mengerek batang dan melubanginya pada tanaman kelapa sawit yang masih muda, sehingga patahnya pangkal pelepah dan dapat menurunkan hasil sebesar 60% panen pertama bahkan 25% mengalami kematian pada tanaman belum menghasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyebaran hama kumbang tanduk (*Oryctes rhinoceros*) di Tbm 1 Perkebunan PP London Sumatera Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung, pada penentuan pohon sampel menggunakan teknik purposive sampling dan data yang diperoleh akan di analisis dengan deskriptif kuantitatif.

Hasil pengamatan hama kumbang tanduk (*Oryctes rhinnoceros*) lebih aktif beraktivitas di malam hari atau yang disebut nocturnal, serta hasil yang diperoleh pengamatan Hama kumbang tanduk menunjukkan bahwa, hama kumbang tanduk (*Oryctes rhinnoceros*) melakukan pola penyebaran secara mengelompok.

Kata kunci : Kelapa Sawit, *Oryctes rhinoceros*, Pola Penyebaran