

ABSTRAK

Pasien penyakit gagal ginjal kronis memerlukan pengobatan yang dapat menggantikan kerja ginjal, yang bersifat tetap berupa cuci darah atau transpalansi ginjal. Pengobatan dilakukan dengan dukungan keluarga agar pasien dapat bertahan dari penyakitnya. Dukungan keluarga berperan penting dalam penyelesaian masalah pasien dan dapat diimplementasikan melalui dorongan, perhatian, empati, motivasi beserta dukungan emosional. Persepsi penyakit merupakan cara berpikir terorganisir yang dianggap sebagai respon manusia terhadap ancaman bagi kesehatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan dukungan keluarga dengan *illness perception* pada penderita gagal ginjal kronis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, sehingga teknik pengumpulan datanya menggunakan lembar observasi. Total populasi yang diperoleh disaat penelitian sebanyak 113 orang pasien yang mengalami gagal ginjal kronik dan 30 responden dimasukkan dalam sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan teknik *Accidental Sampling* atau sebagai metode random sampling dimana sampel yang diambil secara kebetulan ada atau tersedia dilokasi penelitian. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur dukungan keluarga yaitu kuesioner dengan menggunakan skala likert, dan *Brief Illnes Perception (B-IPQ)* adalah kuesioner yang digunakan untuk pengukuran persepsi terhadap penyakit dengan skala interval. Analisa data yang digunakan yaitu Analisa univariat dimana data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan Analisa bivariat yang menggambarkan penyajian data dan dua variable dengan menggunakan *chi-square*. Pembahasan hasil penelitian kemudian dibaut dengan menggunakan teori. Hasilnya adalah 17 orang responden (56,7%) memiliki dukungan keluarga yang baik, dimana 15 orang dengan jawaban baik (50,0%) dan tidak baik sebanyak 2 orang (6,7%). 10 orang responden memiliki dukungan keluarga cukup dimana tujuh orang (23,3%) dengan jawaban baik dan tiga orang (10,0%) dengan jawaban tidak baik. Sedangkan dukungan keluarga kurang sebanyak 3 orang (10,0%), terdiri dari tidak baik sejumlah tiga orang (10,0%) serta baik sejumlah 0 (0%). Hasil uji chi-square didapatkan p-value sebesar 0,006, sehingga hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara dukungan keluarga dengan *illness perception*.

Kata kunci : gagal ginjal kronik, dukungan keluarga, illness perception

ABSTRACT

Patients with chronic kidney failure require treatment that can replace the work of the kidney, which is permanent in the form of dialysis or kidney transplant. Treatment is carried out with family support so that the patient can survive the disease. Family support plays an important role in solving patient problems and can be implemented through encouragement, attention, empathy, motivation and emotional support. Perception of disease is an organized way of thinking that is considered as a human response to threats to health. The purpose of this study was to find out how the relationship between family support and illness perception in patients with chronic kidney failure. The method used in this study consisted of primary and secondary data, so the data collection technique used observation sheets. The total population obtained during the study was 113 patients with chronic kidney failure and 30 respondents were included in the study sample. The sampling technique is by accidental sampling technique or as a random sampling method where samples taken by chance exist or are available at the research location. The measurement tool used to measure family support is a questionnaire using a Likert scale, and Brief Illnes Perception (B-IPQ) is a questionnaire used to measure perceptions of disease with an interval scale. The data analysis used is univariate analysis where the data is presented in a frequency distribution table and bivariate analysis which describes the presentation of data and two variables using chi-square. The discussion of the research results is then linked using theory. The result is that 17 respondents (56.7%) have good family support, of which 15 people with good answers (50.0%) and 2 people (6.7%) have bad answers. 10 respondents had sufficient family support where seven people (23.3%) answered well and three people (10.0%) answered bad. Meanwhile, 3 people (10.0%) lack family support, consisting of three people (10.0%) not good and 0 (0%) good. The results of the chi-square test obtained a p-value of 0.006, so this indicates that there is a positive relationship between family support and illness perception.

Keywords: *chronic kidney failure, family support, illness perception*