

ABSTRAK

Diabetes mellitus memiliki tanda Hiperglikemia dan gangguan metabolisme, di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tujuan terapi diabetes mellitus tipe II adalah untuk mengurangi risiko kompleksitas pembuluh darah besar dan kecil, mengurangi angka pasien yang meninggal dunia, dan mengoptimalkan nilai hidup. Diabetes mellitus membutuhkan waktu yang lama. Karena komplikasi penyakit ini, pengobatan pasien akan menjadi lebih sulit. Ini dapat menyebabkan masalah terkait obat (DRP). DRP adalah kejadian tidak diharapkan yang dialami pasien yang dapat mengganggu keberhasilan terapi obat mereka. Penelitian ini akan melihat obat oral antidiabetes.

Kata Kunci: Diabetes Melitus, DRP, Antidiabetik Oral, Insulin.

Abstract:

Diabetes mellitus has signs of hyperglycemia and metabolic disorders, in low and middle income countries. The goals of type II diabetes mellitus therapy are to reduce the risk of microvascular and macrovascular complications, reduce mortality, and improve quality of life. Diabetes mellitus takes a long time. Due to the complications of this disease, treating patients will become more difficult. This can cause drug-related problems (DRP). DRP is an adverse event experienced by a patient that may interfere with the success of their drug therapy. This study will look at oral antidiabetic drugs.

Keywords : Diabetes Mellitus, DRP, Oral Antidiabetics, Insulin.