

ABSTRAK

Salah satu permasalahan pada ibu hamil dalam mengatasi rasa nyeri dan pemulihan yang cepat pasca operasi. Penelitian ini memfokuskan melakukan pengamatan kepada ibu hamil pasca operasi untuk melakukan perbandingan skala nyeri dan lamanya mobilisasi dini pasca operasi yang menggunakan ERACS TAP Blok dan ERACS tanpa TAP Blok. Penelitian kuantitatif ini dirancang menggunakan pendekatan cross-sectional. Sampel penelitian 40 responden yang dipilih secara purposive sampling. Skala Nyeri diukur menggunakan Visual Analog Scale (VAS) dan Mobilisasi Dini diukur dengan lembar pengamatan. Berdasarkan hasil analisa statistik. Nilai p pada hasil analisis uji mann-whitney pada skala nyeri kedua variabel adalah VAS5 (24 jam) memiliki nilai p 0,028 yang lebih rendah dari 0,05. Pada mobilisasi dini menunjukkan lepas kateter memiliki nilai p 0,002 lebih rendah dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara skala nyeri dan lamanya mobilisasi dini yang menggunakan ERACS TAP Blok dan ERACS tanpa TAP Blok

Kata kunci : VAS, Lembar Pengamatan, Skala Nyeri, Mobilisasi Dini