

ABSTRAK

Rinosinusitis kronis (RSK) adalah suatu kondisi peradangan yang terjadi pada rongga hidung, sinus paranasal, dan saluran napas bagian atas, yang ditandai dengan gejala yang berlangsung secara terus-menerus selama 12 minggu atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik pasien rinosinusitiskronis pada poliklinik THT-KL di RSUD. ROYAL PRIMA MEDAN. Pada penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif dengan metode pengambilan data secara retrospektif melalui data sekunder. Populasi seluruh data rekam medis pasien poliklinik dengan keluhan rinosinusitis kronis di RSUD. ROYAL PRIMA MEDAN tahun 2021-2022 sebanyak 80 data. Data yang diambil secara purposive sampling, yaitu rekam medis yang paling lengkap. Distribusi pasien rinosinusitis kronis menunjukkan kelompok usia paling banyak yaitu pada usia 20-29 tahun (28,4%). Laki-laki lebih banyak terpengaruh (59,7%) dibandingkan perempuan (40,3%). Keluhan utama terbanyak adalah hidung tersumbat (28,4%), dengan sinus maksila paling terinfeksi (47,8%). Tata laksana medikamentosa dominan (55,2%) dibandingkan operatif turbinektomi (44,8%), menekankan perlunya evaluasi kondisi pasien untuk pengobatan yang tepat.

Kata Kunci: Rinosinusitis Kronis, Usia, Jenis Kelamin, Keluhan Utama, Lokasi Sinus, Tata Laksana.

ABSTRACT

Chronic rhinosinusitis (RSK) is an inflammatory condition in the nasal cavity and paranasal sinuses as well as the upper airways characterized by persistent symptoms for 12 weeks. This study aims to determine the characteristics of chronic rhinosinusitis patients at the ENT-KL polyclinic in the hospital. ROYAL PRIMA MEDAN. In this study, a descriptive research design was used with a retrospective data collection method through secondary data. The population of all medical record data of polyclinic patients with chronic rhinosinusitis complaints in the hospital. ROYAL PRIMA MEDAN in 2021-2022 as many as 80 data. The data taken by purposive sampling, which is the most complete medical record. The distribution of chronic rhinosinusitis patients shows the most age group, namely at the age of 20-29 years (28.4%). Men are more affected (59.7%) than women (40.3%). The most common major complaint was nasal congestion (28.4%), with maxillary sinus being the most infected (47.8%). Medicamentosa management was dominant (55.2%) compared to operative turbinectomy (44.8%), emphasizing the need to evaluate the patient's condition for appropriate treatment.

Keywords: Chronic Rhinosinusitis, Age, Gender, Main Complaints, Sinus Location, Administration.