

¿Cuándo deben vacunarse los niños y los adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	DTaP/Tdap Difteria, tétanos, tos ferina	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	Polio	PCV Neumocócica conjugada	Rota Rotavirus	MMR Sarampión, paperas, rubéola	Varicela	HepA Hepatitis A	HPV Virus del papiloma humano	MCV4 Meningocócica conjugada	Influenza (Gripe)
Al nacer	✓											
2 meses	✓ (1 a 2 meses)	✓	✓	✓	✓	✓						
4 meses	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓						
6 meses	✓ (6 a 18 meses)	✓	✓ ²	✓ (6 a 18 meses)	✓	✓						✓ ³ (6 a 59 meses) (Se pone todas las temporadas de gripe)
12 meses		✓ ⁴ (15 a 18 meses)	✓		✓	✓						
15 meses								✓ (12 a 15 meses)	✓ (12 a 15 meses)	✓✓ (2 dosis, la 2ª 6 meses después de la 1ª, a los 12 a 23 meses)		
18 meses												
19 a 23 meses		Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵ (hasta los 5 años)	Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵ (hasta los 5 años)		Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵				
4 a 6 años		✓		✓			✓	✓				
7 a 10 años	Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵										Todos los niños y adolescentes que quieran evitar la gripe se pueden vacunar; todos los niños con factores de riesgo se deben vacunar. ⁸
11 a 12 años		✓ Tdap		Ponerse al día ⁵			Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵	✓✓✓ (sólo mujeres) ⁶	✓	
13 a 18 años		Ponerse al día ⁵ (Tdap/Td)								Ponerse al día ^{5,6}	Ponerse al día ^{5,7}	

- Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna HepB a los 4 meses, dependiendo del tipo de vacuna que use su profesional de la salud.
- Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hib a los 6 meses, dependiendo del tipo de vacuna que use su profesional de la salud.
- Si su hijo tiene menos de 9 años y lo van a vacunar contra la gripe por primera vez, le deben dar 2 dosis, la segunda al menos 4 semanas después de la primera.
- Esta dosis de DTaP se puede dar incluso a los 12 meses de edad, si pasaron 6 meses desde la dosis anterior y cree que tal vez no vuelva para más vacunas cuando su hijo tenga 18 meses de edad.

- Si se atrasa con alguna vacuna, o se le olvida por completo, su hijo debe recibirla lo antes posible.
- Todas las niñas y mujeres de 9 a 26 años de edad se deben vacunar con 3 dosis de la vacuna HPV, a lo largo de un período de 6 meses.
- Si tiene un adolescente que va a ir a la universidad y tiene planes de vivir en una residencia estudiantil, y no lo vacunaron antes contra la enfermedad meningocócica, se debe vacunar ahora.
- Los niños y adolescentes con ciertos problemas médicos se deben vacunar contra la influenza (también conocida como gripe). La vacuna también es importante para los que tienen contacto cercano con niños menores de 6 años de edad y otras personas en riesgo. Hable con su profesional de la salud.

Nota: Algunos niños pueden necesitar más vacunas. Hable con su profesional de la salud.

Translation by Transcend, Davis, CA

www.immunize.org/catg.d/p4050-01.pdf • Item #P4050-01 Spanish (1/08)