



NOTA TÉCNICA Nº 03/2023-SESA/SSVS/GEVS/PEI

Vitória, 01 de fevereiro de 2023.

Orientações sobre os esquemas das vacinas Covid-19.

Diante das atualizações do Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da Vacinação contra a Covid-19, seguem os esquemas das vacinas Covid-19 adotados no estado.

Esta nota atualiza os esquemas vacinais apresentados na NTº 36/2022-SESA/SSVS/GEVS/PEI, de 07 de dezembro de 2022.

Para informações adicionais, este corpo técnico se coloca à disposição e pode ser contactado através dos telefones (27) 3636-8424, (27) 3636-8425 ou email: imunizacao@saude.es.gov.br.

Crianças de 6 meses a 4 anos de idade

D1	D2	D3
Pfizer pediátrica para menor de 5 anos (tampa vinho)	4 semanas após D1 com Pfizer pediátrica menor de 5 anos	8 semanas após D2 com Pfizer pediátrica menor de 5 anos

Crianças de 3 e 4 anos de idade

D1	D2	Reforço
Coronavac	28 dias após D1 com Coronavac	4 meses após D2 com Pfizer pediátrica para menor de 5 anos

Crianças de 5 a 11 anos de idade

Coronavac	28 dias após D1 com Coronavac	4 meses após D2 com Pfizer pediátrica
Pfizer pediátrica (tampa laranja)	8 semanas após D1 com Pfizer pediátrica	4 meses após D2 com Pfizer pediátrica

Adolescentes de 12 a 17 anos de idade, incluindo gestantes e puérperas

D1	D2	Reforço
Coronavac	28 dias após D1 com Coronavac	4 meses após D2 com Coronavac ou Pfizer
Pfizer	8 semanas após D1 com Pfizer	4 meses após D2 com Coronavac ou Pfizer



Pessoas da população geral de 18 a 59 anos, não gestantes ou puérperas						
D1	D2		Reforço (REF)		2º Reforço (R2)	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac*	28 dias após D1	Coronavac	4 meses após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer
Astrazeneca	8 semanas após D1	AstraZeneca ou Pfizer	4 meses após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	4 meses após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer

* Em caso de recusa explícita do usuário ao esquema heterólogo, fica autorizada aplicação do esquema homólogo.

Gestantes e puérperas a partir de 18 anos de idade						
D1	D2		Reforço (REF)		2º Reforço (R2)	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac**	28 dias após D1	Coronavac	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.	4 meses após REF	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.
Pfizer**	8 semanas após D1	Pfizer	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.	4 meses após REF	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.

**Vacinas de vetor viral (AstraZeneca e Janssen) não são recomendadas para gestantes e puérperas.

Pessoas idosas acima de 60 anos de idade						
D1	D2		Reforço		2º Reforço (R2)	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac*	28 dias após D1	Coronavac	3 meses após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.	3 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.
Astrazeneca	8 semanas após D1	AstraZeneca ou Pfizer	3 meses após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.	3 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	3 meses após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.	3 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.

* Em caso de recusa explícita do usuário ao esquema heterólogo, fica autorizada aplicação do esquema homólogo.

Adolescentes de 12 a 17 anos de idade imunocomprometidos, incluindo gestantes e puérperas			
D1	D2	Dose adicional	Reforço
Pfizer	8 semanas após D1 com Pfizer	8 semanas após D2 com Pfizer	A partir de 4 meses após a Dose adicional com Pfizer



Pessoas imunocomprometidas de 18 a 59 anos, não gestantes ou puérperas

D1	D2		Dose adicional (DA)		Reforço (REF)		2º Reforço (R2)	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	Coronavac	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer
Astrazeneca	8 semanas após D1	AstraZeneca ou Pfizer	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer

Gestantes e puérperas imunocomprometidas a partir de 18 anos de idade

D1	D2		DOSE ADICIONAL		REFORÇO		2º Reforço (R2)	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac*	28 dias após D1	Coronavac	8 semanas após D2	Mesmo Imunizante do esquema primário	4 meses após Dose Adicional	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac	4 meses após REF	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac
Pfizer*	8 semanas após D1	Pfizer	8 semanas após D2	Mesmo Imunizante do esquema primário	4 meses após Dose Adicional	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac	4 meses após REF	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac

*Vacinas de vetor viral (AstraZeneca e Janssen) não são recomendadas para gestantes e puérperas.

Pessoas imunocomprometidas idosas acima de 60 anos de idade

D1	D2		Dose adicional		Reforço		2º Reforço (R2)	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac*	28 dias após D1	Coronavac	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário	3 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	3 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer
Astrazeneca	8 semanas após D1	AstraZeneca ou Pfizer	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário	3 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	3 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário	3 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	3 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer

* Em caso de recusa explícita do usuário ao esquema heterólogo, fica autorizada aplicação do esquema homólogo.



RECOMENDAÇÃO DE VACINAÇÃO PARA AS PESSOAS QUE RECEBERAM ESQUEMA PRIMÁRIO DE JANSSEN:

Pessoas de 18 a 59 anos, com esquema primário com Janssen, exceto gestante e puérpera								
Imunizante DOSE	D2		Reforço (REF)		2º Reforço (R2)		3º Reforço (R3)	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Janssen	Não indicado	Não se aplica	8 semanas após D	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após Ref	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após R2	AstraZeneca, Janssen, Pfizer

Pessoas idosas acima de 60 anos com esquema primário com Janssen								
Imunizante DOSE	D2		Reforço (REF)		2º Reforço (R2)		3º Reforço (R3)	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Janssen	Não indicado	Não se aplica	8 semanas após D	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	3 meses após Ref	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	3 meses após R2	AstraZeneca, Janssen, Pfizer

Gestantes e Puérperas com esquema primário de Janssen								
Imunizante DOSE	D2		Reforço (REF)		2º Reforço (R2)		3º Reforço (R3)	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Janssen*	Não indicado	Não se aplica	8 semanas após D	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac	4 meses após Ref	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac	4 meses após R2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac

*Caso a mulher tenha recebido a dose antes da gestação.

Pessoas <u>imunocomprometidas</u> de 18 a 59 anos, não gestantes ou puérperas, com esquema primário de Janssen.										
Imunizante DOSE	D2		Dose adicional		Reforço (REF)		2º Reforço (R2)		3º Reforço (R3)	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Janssen	Não indicado	Não se aplica	8 semanas após D	Janssen	4 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após R2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer

Pessoas idosas <u>imunocomprometidas</u> acima de 60 anos, com esquema primário de Janssen.										
Imunizante DOSE	D2		Dose adicional		Reforço (REF)		2º Reforço (R2)		3º Reforço (R3)	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Janssen	Não indicado	Não se aplica	8 semanas após D	Janssen	3 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	3 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer	3 meses após R2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer