

EA CADAR 2013 – GABARITO OFICIAL

ESPECIALIDADE: RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	A
32	C
33	B
34	D
35	A
36	#
37	C
38	C
39	D
40	D
41	C
42	#
43	B
44	A
45	B
46	D
47	D
48	B
49	C
50	B
51	C
52	B
53	#
54	#
55	C
56	B
57	C
58	B
59	A
60	A

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	B
32	A
33	B
34	#
35	C
36	D
37	D
38	C
39	C
40	#
41	A
42	D
43	B
44	C
45	A
46	A
47	A
48	B
49	C
50	B
51	C
52	#
53	#
54	B
55	C
56	B
57	C
58	B
59	D
60	D

- As questões com # foram anuladas;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVAS DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES

36 VERSÃO A / 40 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

A questão apresenta duas respostas corretas. Tanto a alternativa que descreve que na técnica oclusal da região de túber, o filme deve ser posicionado na boca do paciente, de modo que o longo eixo fique paralelo ao plano sagital mediano do paciente; quanto a alternativa que relata que pacientes edêntulos devem segurar o filme com os dedos polegares estão corretas, baseadas na bibliografia: Freitas, Aguinaldo de; Rosa, José Edu; Souza, Icléo Faria e. Radiologia odontológica. 6ª Ed. São Paulo: Artes Médicas, 2004, página 142.

42 VERSÃO A / 34 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Questão anulada devido à divergência entre as bibliografias adotadas. Embora os canais lacrimais sejam rotineiramente vistos nas projeções oclusais da maxila, o mesmo pode também ser visualizado nas radiografias periapicais da região de canino, considerando-se a bibliografia de White, Stuart C; Pharoah, Michael J. Radiologia oral: fundamentos e interpretação. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, adotada neste concurso, onde cita na página 179 que ocasionalmente o canal nasolacrimal pode ser visibilizado nas radiografias periapicais na região do ápice dos caninos, como citado na questão. Entretanto na bibliografia do Freitas, Aguinaldo de; Rosa, José Edu; Souza, Icléo Faria e. Radiologia odontológica. 6ª Ed. São Paulo: Artes Médicas, 2004, página 304 é citado que o canal nasolacrimal corresponde a um registro anatômico somente observado nas radiografias oclusais da maxila, sendo identificado como uma área radiolúcida bem definida, de forma mais ou menos arredondada próximo aos primeiros ou segundos molares.

53 VERSÃO A / 53 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Questão anulada devido à contradição entre as bibliografias adotadas: FREITAS, Aguinaldo de; ROSA, José Edu; SOUZA, Icléo Faria e. Radiologia odontológica. 6.ed. São Paulo: Artes Médicas, 2004 e Whaites, Eric. Princípios de radiologia odontológica. 4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

54 VERSÃO A / 52 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Questão anulada devido à contradição entre as bibliografias adotadas: FREITAS, Aguinaldo de; ROSA, José Edu; SOUZA, Icléo Faria e. Radiologia odontológica. 6.ed. São Paulo: Artes Médicas, 2004 e Whaites, Eric. Princípios de radiologia odontológica. 4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.