

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

| Nº de Inscrição | Nome |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Unidomiciliar

QUESTÃO 01

São drogas utilizadas no tratamento da dor neuropática todas as citadas abaixo, **EXCETO**:

- a) Clonidina.
- b) Gabapentina.
- c) Clonazepam.
- d) Amitriptilina.
- e) Baclofen.

QUESTÃO 02

São fatores de risco para quedas em pacientes idosos, **EXCETO**:

- a) Uso de benzodiazepínicos.
- b) Hipotensão postural.
- c) Uso de meias compressivas.
- d) Iluminação ambiental inadequada.
- e) Urgência urinária.

QUESTÃO 03

São causas transitórias de incontinência urinária no paciente idoso todas as seguintes, **EXCETO**:

- a) Drogas anticolinérgicas.
- b) Fatores psicológicos.
- c) Infecção urinária.
- d) Incontinência urinária genuína de esforço.
- e) Impactação fecal.

QUESTÃO 04

São sintomas encontrados em pacientes com disautonomia, todos os relacionados abaixo, **EXCETO**:

- a) Distúrbios de controle esfinteriano.
- b) Anosmia.
- c) Síncope.
- d) Disfunção sexual.
- e) Vômitos.

QUESTÃO 05

São achados clínicos compatíveis com isquemia do sistema arterial vértebro-basilar:

- a) Vertigem.
- b) Coma.
- c) Dor espontânea.
- d) Tetraplegia flácida.
- e) Afasia de Wernicke.

QUESTÃO 06

Em relação à vacinação anti-influenza em adultos, escolha a única alternativa **CORRETA**:

- a) Aumenta o risco de síndrome de Guillain-Barré.
- b) É indicada de dois em dois anos.
- c) Reações adversas locais são raras, mas febre calafrios e mal-estar são bastante comuns após sua administração.
- d) Não têm a propriedade de interferir em testes sorológicos para HIV, HTLV-1 e HCV.
- e) Idosos e pacientes imunodeprimidos podem ter uma resposta imunológica insatisfatória.

QUESTÃO 07

São exemplos de antibióticos associados a inibidores de betalactamases todos os abaixo, **EXCETO**:

- a) Imipenem e cilastatina.
- b) Ticarcilina e ácido clavulânico.
- c) Ampicilina e sulbactam.
- d) Piperacilina e tazobactam.
- e) Amoxicilina e ácido clavulânico.

QUESTÃO 08

Deficiências nutricionais podem provocar alterações clínicas cutâneas. Entre as conhecidas, todas as relacionadas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- a) Pele seca e descamativa devido a deficiência de Vitamina A ou Zinco.
- b) Palidez cutânea e carência de ferro ou vitamina B12.
- c) Hiperqueratose folicular e carência de vitamina D.
- d) Púrpuras e petéquias e carência de Vitaminas C ou K.
- e) Diminuição de gordura subcutânea e deficiência de calorías.

QUESTÃO 09

Qual dos hipoglicemiantes orais abaixo relacionados tem como mecanismo de ação principal a sensibilização de tecidos periféricos à ação da insulina:

- a) Acarbose.
- b) Glimepirida.
- c) Rosiglitazona
- d) Repaglinida.
- e) Clorpropamida.

QUESTÃO 10

Em relação ao tratamento das dislipidemias, assinale a única alternativa **CORRETA**:

- a) O ácido nicotínico (niacina) reduz o nível do colesterol LDL e VLDL, mas provoca também redução do HDL-colesterol, o que limita um pouco seu uso.
- b) Dietas com teores muito baixos de gordura total ou gordura saturada podem diminuir tanto o HDL quanto LDL colesterol.
- c) A combinação de um inibidor da HMG-CoA redutase e de um fibrato tem como objetivos a potencialização da ação e a redução de riscos de efeitos adversos.
- d) A ezetimiba age na inibição da produção das lipoproteínas de baixa densidade no fígado.
- e) Os fibratos agem aumentando o HDL, diminuindo o LDL e quase nada interferindo nos níveis de triglicérides.

QUESTÃO 11

São fatores causais de hipertensão arterial sistêmica todos os abaixo relacionados, **EXCETO**:

- a) Hiperaldosteronismo primário.
- b) Doença de Addison.
- c) Síndrome da apnéia obstrutiva do sono.
- d) Antiinflamatórios não-esteróides.
- e) Hipercalcemia.

QUESTÃO 12

Em relação às úlceras de pressão ou úlceras de decúbito, todas as afirmativas estão corretas, **EXCETO**:

- a) Em pacientes imunodeprimidos, lesões por herpes simples podem simular tal quadro.
- b) Acometem predominantemente áreas de pele adjacentes a proeminências ósseas ou cartilaginosas.
- c) Higienização da pele e suporte nutricional são fatores contribuintes para a prevenção.
- d) Antibióticos tópicos são rotineiramente recomendados.
- e) Infecções acometendo tecidos profundos podem demandar antibioticoterapia sistêmica.

QUESTÃO 13

Em relação ao tromboembolismo venoso pulmonar, todas as afirmativas estão corretas, **EXCETO**:

- a) Uma das principais complicações da terapia anticoagulante com heparina é a trombocitopenia por toxicidade medular.
- b) Trombos confinados às veias profundas da região das panturrilhas raramente embolizam para a circulação pulmonar.
- c) O sinal radiológico de Westermarck não é um achado freqüente.
- d) A warfarina sódica é teratogênica e não deve ser utilizada em gestantes.
- e) A sensibilidade do Dímero-D é bastante elevada, mas sua especificidade é considerada baixa.

QUESTÃO 14

A diarreia associada ao uso de antibióticos e a colite associada ao uso de antibióticos são complicações relativamente freqüentes decorrentes do uso de vários tipos diferentes de antimicrobianos. Em relação a essas doenças, todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- a) O uso de cefalosporinas de terceira geração contribui para reduzir as chances de colite, já que poupa parte importante da flora gram-positiva intestinal.
- b) A maioria dos casos de diarreia associada ao uso de antibióticos ocorre devido a mudanças na flora bacteriana fermentadora e não a infecção pelo *Clostridium difficile*.
- c) Em pacientes com colite, a pesquisa de leucócitos fecais costuma ser positiva em cerca de 50% dos casos.
- d) A pesquisa de toxinas A e B nas fezes pode ser útil para a caracterização da colite pelo *Clostridium difficile*.
- e) Vancomicina administrada por via enteral é uma alternativa terapêutica eficaz na colite pseudomembranosa.

QUESTÃO 15

Todos os cuidados abaixo relacionados devem ser adotados em pacientes com insuficiência renal crônica, **EXCETO**:

- a) Restrição sódica, em especial nos hipertensos.
- b) Restrição de potássio.
- c) Suplementação de cálcio.
- d) Restrição de magnésio, sobretudo de laxativos ou antiácidos que os contenham.
- e) Dieta hiperprotéica com até 2g/Kg/dia, especialmente nos indivíduos naqueles com proteinúria.

QUESTÃO 16

Em pacientes com AIDS, a profilaxia de infecções oportunistas pode ser necessária. Em relação a esses casos, todas as afirmativas estão corretas, **EXCETO**:

- a) A pneumocistose pode ser prevenida pelo uso de sulfametoxazol-trimetoprim, pentamidina ou dapsona.
- b) Contagem de CD4 e história pregressa de infecções oportunistas são parâmetros úteis na indicação de profilaxias.
- c) Claritromicina pode ser utilizada na profilaxia de infecções pelo complexo *Micobacterium avium*.
- d) Uma vez iniciado um esquema profilático, ele deve ser mantido indefinidamente, independentemente do motivo que levou a sua prescrição.
- e) Indivíduos com IgG anti-CMV negativo não estão em risco de desenvolver a doença por esse agente oportunista.

QUESTÃO 17

Na anemia de doença crônica, todos os aspectos clínicos abaixo são observados, **EXCETO**:

- a) Usualmente é do tipo normocítica e normocrômica.
- b) Ferritina está freqüentemente normal ou elevada.
- c) Fisiopatologicamente é decorrente de carência de ácido fólico e ferro, associada à insuficiência medular.
- d) A eritropetina pode ser utilizada em alguns casos.
- e) Câncer, hepatopatia crônica e condições inflamatórias crônicas são causas freqüentes.

QUESTÃO 18

São drogas úteis no tratamento da osteoporose pós-menopausa todas as abaixo, **EXCETO**:

- a) Calcitonina.
- b) Bromocriptina.
- c) Ácido zoledrônico.
- d) Raloxifeno.
- e) Ergocalciferol.

QUESTÃO 19

No tratamento da depressão, todas as opções farmacológicas e não-farmacológicas abaixo relacionadas podem ser úteis, **EXCETO**:

- a) Tiroxina em dose suprafisiológica.
- b) Inibidores seletivos da recaptção de serotonina.
- c) Eletroconvulsoterapia.
- d) Psicoterapia.
- e) Estruturas de apoio social.

QUESTÃO 20

O delirium ou estado confusional agudo pode ser precipitado por todas as situações descritas abaixo, **EXCETO**:

- a) Suspensão de hipnóticos-sedativos.
- b) Uso de digoxina.
- c) Hipomagnesemia.
- d) Hipotireoidismo.
- e) Terapêutica com norfloxacin.

QUESTÃO 21

São causas de demência potencialmente reversíveis todas as relacionadas abaixo, **EXCETO**:

- a) Deficiência de vitamina B12.
- b) Hidrocefalia de pressão normal.
- c) Hematoma subdural crônico.
- d) Demência com corpos de Lewy.
- e) Infecção por HIV.

QUESTÃO 22

São exemplos de drogas úteis no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, com redução de morbi-mortalidade, **EXCETO**:

- a) Maleato de enalapril.
- b) Digoxina.
- c) Valsartan.
- d) Espironolactona.
- e) Metoprolol.

QUESTÃO 23

São medidas úteis como screening de câncer em adultos médios com razoável evidência para sua recomendação todas as abaixo, **EXCETO**:

- a) Toque retal em homens e mulheres acima de 50, para detecção de câncer de reto.
- b) Pesquisa de sangue oculto fecal em adultos com mais de 50 anos, para detecção de câncer colorretal.
- c) Exame de citologia cervical uterina (Papanicolaou) em mulheres que iniciaram atividade sexual, para detecção de câncer de colo uterino.
- d) Mamografia em mulheres com mais de 40 anos, para detecção de câncer de mama.
- e) Exame clínico das mamas em mulheres, especialmente a partir de 40 anos, para detecção de câncer de mama.

QUESTÃO 24

São causas de hiponatremia todas as relacionadas abaixo, **EXCETO**:

- a) Hipotireoidismo.
- b) Polidipsia psicogênica.
- c) Deficiência de ACTH.
- d) Diabetes insipidus nefrogênico.
- e) Reação idiossincrásica com inibidores da ECA.

QUESTÃO 25

Em relação às infecções do trato urinário, todas as afirmativas estão corretas, **EXCETO**:

- a) *Escherichia coli* é o principal agente nas cistites.
- b) Febre não é um achado comum nas cistites.
- c) Na prostatite aguda, a principal via de implantação bacteriana é hematogênica.
- d) Na pielonefrite aguda pode haver o encontro de clindros leucocitários em exame de urina rotina.
- e) Nitrofurantoína e sulfametoxazol-trimetoprim são opções para uso profilático, quando indicado.

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais, inclusive de saúde, impuseram importantes transformações na prática médica.”

Extraída do *abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública*, 1999.