

후대교배종 유전자변형 면화
GHB614 x T304-40 x GHB119 x COT102

2015. 3. 18.

후대교배종 유전자변형 면화

GHB614 x T304-40 x GHB119 x COT102

1. 검토경위

- 바이엘크롭사이언스에서 후대교배종의 안전성평가 대상 검토 신청 : 2014. 12. 9.
- 제1차 심사위원회 개최 : 2015. 2. 10.

2. 검토 신청 품목 개요

- 제초제내성 및 해충저항성 GM 면화 GHB614×T304-40×GHB119와 해충저항성 GM 면화 COT102의 교배종

- 기본 특성

특성	모본 GHB614	T304-40×GHB119	COT102
해충저항성		<i>cry1Ab</i> 및 <i>cry2Ae</i> (인시류)	<i>vip3Aa19</i> (인시류)
제초제내성	<i>2mepsps</i> (glyphosate)	<i>bar</i> (glufosinate)	
선택마커			<i>aph4</i> (하이그로마이신 내성)

- 삽입 단백질 : 총 6종류
- 인시류 : 면화다래벌레(*Helicoverpa zea*), 담배좀벌레(*Heliothis virescens*) 등

- GHB614

- 특성 : 제초제(glyphosate)에 대한 내성(*2mepsps*)
- 승인 : 2010.10.25.
- 후대교배종

- ① GHB614×LLcotton25 (2012.04.19.)

[제초제(glyphosate, glufosinate) 내성(*2mepsps*, *bar*)]

- ② GHB614×LLcotton25×15985 (2013.01.03.)

[해충저항성(*cry1Ac*, *cry2Ab2*) 및 제초제(glyphosate, glufosinate) 내성(*2mepsps*, *bar*)]

③ GHB614×T304-40×GHB119 (2013.06.27.)

[해충저항성(*cry1Ab*, *cry2Ae*) 및 제초제(*glyphosate*, *glufosinate*) 내성(*2mepsps*, *bar*)]

○ T304-40×GHB119

- 특성 : 해충에 대한 저항성(*cry1Ab*, *cry2Ae*) 및 제초제(*glufosinate*)에 대한 내성(*bar*)
- 승인 : 2013. 1. 25.
- 후대교배종

① GHB614×T304-40×GHB119 (2013. 6. 27.)

[해충저항성(*cry1Ab*, *cry2Ae*) 및 제초제(*glyphosate*, *glufosinate*) 내성(*2mepsps*, *bar*)]

○ COT102

- 특성 : 해충에 대한 저항성(*vip3Aa19*)
- 승인 : 2014. 1. 9.
- 후대교배종

① 281/3006×COT102×MON88913 (2014. 6. 24.)

[해충저항성(*cry1Ac*, *cry1F*, *vip3Aa19*) 및 제초제(*glyphosate*, *glufosinate*) 내성(*pat*, *cp4 epsps*)]

3. 검토 결과

3-1. 특성의 변화가 없음을 입증하는 자료

○ Southern blot 분석

- GHB614×T304-40×GHB119×COT102에서 모본인 GHB614, T304-40×GHB119, COT102의 삽입유전자가 안정적으로 보존되는지 여부를 확인하기 위하여 Southern blot을 실시한 결과,
- GHB614×T304-40×GHB119×COT102에서 확인된 제한효소 절편의 크기는 모본인 GHB614, T304-40×GHB119, COT102에서의 크기와 일치하였다.

- 따라서 GHB614, T304-40xGHB119 및 COT102에서의 각각 삽입유전자가 GHB614xT304-40xGHB119xCOT102에 안정적으로 존재하고 있음이 확인되었다.

○ 단백질 발현량 비교

- GHB614xT304-40xGHB119xCOT102의 잎, 뿌리, 봉오리(square), 다래(boll, 면화씨가 들어 있는 꼬투리), 전체부위 및 면실에서 단백질 발현량을 모본인 GHB614, T304-40xGHB119 및 COT102의 단백질 발현량과 각각 비교분석하였다.
- 측정에 사용된 면화는 2013년 미국내 3개 포장에서 수확되었으며, 난괴법으로 모든 샘플에 대해 4회 반복구로 구성되었다.

① Cry1Ab

Cry1Ab 발현량을 측정한 결과 모본과 후대교배종 모두 잎에서 가장 높게 측정되었으며 다래(boll)에서 통계적 유의차가 나타났으나, 면실에서는 통계적 유의차가 없었다.

② Cry2Ae

Cry2Ae 발현량을 측정한 결과 모본과 후대교배종 모두 잎에서 가장 높게 측정되었으며 모든 부위에서 통계적 유의차가 없었다.

③ Vip3Aa19

Vip3Aa19 발현량을 측정한 결과 모본과 후대교배종 모두 잎에서 가장 높게 측정되었으며, 봉오리(square)에서 통계적 유의차가 나타났으나, 면실에서는 통계적 유의차가 없었다.

④ 2mEPSPS

Vip3Aa19 발현량을 측정한 결과 모본과 후대교배종 모두 잎에서 가장 높게 측정되었으며 면실에서 통계적 유의차가 나타났으나 각 성분 분석치 범위가 각각 과거범위(historical range) 이내로 생물학적 유의차는 없었다.

⑤ PAT/bar

PAT/bar 발현량을 측정한 결과 모본과 후대교배종 모두 잎에서 가장 높게 측정되었으며 면실과 전체부위(whole plant)에서 통계적 유의차가 나타났으나 각 성분 분석치 범위가 각각 과거범위(historical range) 이내로 생물학적 유의차는 없었다.

⑥ APH4

APH4 단백질은 모본과 후대교배종 모두 발현량이 검출한계(LOQ) 또는 최소정량한계(LLOQ) 이하로 통계 분석이 수행되지 않았다. 다만 봉오리 초기 성장단계의 잎 샘플에서만 모본에서 0.55 µg/g dw, 후대교배종에서 0.65 µg/g dw 수준으로 측정되었다.

○ Bioefficacy 비교

< 제초제 내성 수준 >

① 글리포세이트 내성

GHB614xT304-40xGHB119xCOT102와 모본인 GHB614에 대해 글리포세이트(2mEPSPS) 제초제 내성 수준을 측정하였다. 제초제 살포 후 13일, 19일 경과 시점에서 0~9등급범위로 약해증상을 육안 관찰한 결과 후대교배종과 GHB614 사이에 저항성 수준은 차이가 없었다.

② 글루포시네이트 내성

GHB614xT304-40xGHB119xCOT102와 모본인 T304-40xGHB119에 대해 글루포시네이트(PAT/*bar*) 제초제 내성 수준을 측정하였다. 제초제 살포 후 7일, 15일 경과 시점에서 0~9등급범위로 약해증상을 육안 관찰한 결과 후대교배종과 T304-40xGHB119 사이에 저항성 수준은 차이가 없었다.

< 해충 저항성 수준 >

GHB614xT304-40xGHB119xCOT102와 모본인 T304-40xGHB119(Cry1Ab, Cry2Ae) 및 COT102(Vip3Aa19)의 인시류 저항성 수준을 측정하였다. 7개의 그룹과 4개의 반복구로 설정하였으며, 면화다래벌레(*Helicoverpa zea*)와 담배나방(*Heliothis virescens*) 대상으로 하였다.

저항성 수준을 측정한 결과 GHB614xT304-40xGHB119xCOT102와 모본인 T304-40xGHB119 및 COT102 사이에 통계적인 유의차가 없었다.

○ 성분분석

- GHB614xT304-40xGHB119xCOT102과 모본 간의 특성에 변화가 없음을 확인하기 위해, 2013년 미국의 8개 포장시험 장소에서 재배한 후대교배종 면화, 비유전자 변형 대조군, 6종의 비유전자 변형 상업용 품종을 6개의 그룹, 4회 반복구로 난괴법에 따라 배치하여 재배하였다.

- 제초제 처리군에는 제초제가 3회 살포되었다. 글루포시네이트는 2~4 엽기단계에서 1차 살포되었고 개화초기단계에서 2차 살포되었으며 글리포세이트는 6~8 엽기 단계에서 1회 살포 되었다.
- 측정된 값에 대해서는 ANOVA 분석이 수행되었으며 그룹간 유의적인 차이가 발생한 경우 상업용 품종의 99% 허용범위와 문헌범위 내에 포함되는지를 확인 하였다.

① 주요영양성분 및 섬유질

수분, 단백질, 회분, 산성세제불용성섬유 및 중성세제불용성섬유에 대해서는 유의적인 차이가 관찰되지 않았다. 지방과 탄수화물의 경우 유의적인 차이가 있었으나 최대-최소값이 모두 상업적 품종의 99% 허용범위 또는 문헌범위 내에 포함되어 생물학적 유의차는 보이지 않았다.

② 무기질

칼슘, 철, 마그네슘, 망간, 아연에 대해서는 유의적인 차이가 관찰되지 않았다 (나트륨의 경우 분석값 1/3 이상이 정량한계 이하로 통계분석에서 제외). 구리와 인의 경우 유의적인 차이가 있었으나 최대-최소값이 모두 상업적 품종의 99% 허용범위 또는 문헌범위 내에 포함되어 생물학적 유의차는 보이지 않았다.

③ 토코페롤

알파 토코페롤과 총 토코페롤 성분에서 유의적인 차이가 관찰되지 않았다. 감마 토코페롤의 경우 유의적인 차이가 있었으나 최대-최소값이 모두 상업적 품종의 99% 허용범위 또는 문헌범위 내에 포함되어 생물학적 유의차는 보이지 않았다.

④ 항영양소

Total gossypol, free gossypol, dihydrosterculic acid, malcalic acid, sterculic acid 등 측정한 모든 성분에서 유의적인 차이가 관찰되었다. 그러나 모든 성분의 분석치가 상업적 품종의 99% 허용범위 또는 문헌범위 내에 포함되어 생물학적 유의차는 보이지 않았다.

⑤ 아미노산

분석된 알라닌 등 아미노산 18종 모두 유의적인 차이가 관찰되지 않았다.

3-2. 이종간의 교배가 일어나지 않았음을 입증하는 자료

- GHB614xT304-40xGHB119xCOT102는 동종교배에 의해 육종된 것이다.

3-3. 섭취량, 가식부위 및 가공법이 종래의 품종과 다르지 않음을 입증하는 자료

- GHB614xT304-40xGHB119xCOT102는 3종의 모본(GHB614, T304-40xGHB119, COT102)을 교배, 육종한 것으로서 종래의 모본과 비교하여 섭취량, 가식부위 및 가공법에 차이가 없다.

4. 결론

- 제 120차 ‘유전자변형식품등 안전성 심사위원회’에서 후대교배종 유전자변형 면화 GHB614xT304-40xGHB119xCOT102는 특성의 변화가 없었으며, 이종간의 교배가 일어나지 않았고, 섭취량, 가식부위, 가공방법이 종래의 품종과 다르지 않았으므로 안전성이 확인되어 추가적인 안전성평가가 필요하지 않은 것으로 결론을 내렸다.