Activités supplémentaires

© ERPI Reproduction et modifications autorisées uniqueme	done los placasos en la mananal Observatoire est milios
© ERPI	0000

ent.

4. Indiquez la charge de l'ion formé pour chacun des énoncés ci-dessous.

a) Un ion comporte 15 protons et 18 électrons.

b) Un atome neutre gagne deux électrons.

Chrome, strontium, iode, radon, soufre, lithium.

Nombre

d'électrons

de la tendance

Groupe : _____ Date : ____

Nom : _		Groupe :	Date :
	Un atome neutre perd un électron.		
d)	Un ion comporte 38 protons et 36 électrons.		
е)	L'ion Fe ²⁺ perd un électron.		

5. Remplissez le tableau ci-dessous.

Élément	Nombre de protons	Nombre d'électrons
Na		
S ²⁻		
	12	10
Cr ³⁺		
Br ⁻		

- LES PROPRIÉTÉS DES SOLUTIONS (p. 50-61)
- 6. L'étiquette d'un contenant de lait au chocolat indique qu'il contient 10 mg de cholestérol par portion de 250 ml.

a)	Quelle est la concentration du cholestérol en g/L ?

b) Quelle est sa concentration en ppm?

Groupe : _____ Date : _

Nom:

Nom : _

_____ Groupe : _____ Date : _____

10. Dans un échantillon de 650 g de roche, vous notez la présence de 0,2 g d'or.

Quelle est la concentration de l'or en ppm?

12. Vous mélangez 50 ml d'une solution de NaOH à 4 % (m/V) avec 100 ml d'une autre solution

de NaOH à 4 g/L. Quelle est la concentration molaire de la solution résultante ?


Groupe : _____ Date : ____

Nom :	Groupe :	Date :

15. L'eau de chaux qu'on utilise pour détecter la présence de dioxyde de carbone est une solution de dihydroxyde de calcium (Ca(OH)₂). Dominique prépare 500 ml d'une solution d'eau de chaux à une concentration de 37 g/L. Quel volume de la solution contient 2,5 g de dihydroxyde de calcium ?



16. Indiquez ce qui distingue chaque paire de solutions énoncée ci-dessous et ce qui permet d'expliquer la différence du comportement d'une ampoule branchée comme dans l'illustration suivante.



- a) 100 ml d'une solution d'éthanol n'allument pas l'ampoule.
 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique allument l'ampoule en produisant une lumière brillante.
- **b)** 100 ml d'une solution d'acide fluorhydrique à 1 mol/L allument l'ampoule en produisant une faible lumière.

100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 1 mol/L allument l'ampoule en produisant une lumière brillante.

c) 100 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium à 1 mol/L allument l'ampoule en produisant une lumière brillante.

100 ml d'une solution d'hydroxyde de potassium à 0,01 mol/L allument l'ampoule en produisant une faible lumière.

Observatoire / Guide

Nom :		Groupe :	Date :
17. Ind	liquez si chad	cune des substances suivantes est un acide, une base	ou un sel.
a)	HNO ₃		
b)	AIPO ₄		
c)	LiOH		
d)	H_2CO_3		
e)	FeCl ₃		
f)	Ca(OH) ₂		
g)	H_2S		
18. Qu	elle propriété	e les acides, les bases et les sels en solution ont-ils en d	commun ?
		boisson, Minh constate qu'elle a un goût aigre. Il veut vne solution acide ou basique.	rérifier si ce goût
a)	Quel test de	vra-t-il faire ?	
b)	Quel résulta	t devrait-il obtenir et quelle sera sa conclusion?	
20. Éci	rivez l'équation	on de dissociation électrolytique de chacune des substa	ances suivantes.
a)	LiNO ₃		
b)	Ca(OH) ₂		
c)	Nal		
d)	Be ₃ N ₂		
			

Nom :	Groupe : Date :
	uel test peut-on réaliser au laboratoire pour distinguer les paires de substances suivantes ? récisez les résultats qu'il serait possible d'observer pour chacune des paires.
a)	Un acide d'une base.
b)	Un électrolyte d'un non-électrolyte.
c)	Un électrolyte fort d'un électrolyte faible.
	diquez si chacune des solutions ci-dessous permet ou non de laisser passer le courant ectrique et expliquez pourquoi.
a)	Une solution de méthanol (CH ₃ OH).
b)	Une solution de chlorure de potassium (KCI).
c)	Une solution d'hydroxyde de magnésium (Mg(OH) ₂).
d)	Une solution de sucre (C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁).
2 3. Vr	rai ou faux. Si un énoncé est faux, corrigez-le.
a)	Le pH d'une solution acide est supérieur à 7.
b)	Une solution dont le pH est 2 est deux fois plus acide qu'une solution dont le pH est 4.

Nom:	Groupe : Date :
c)	Plus le pH d'une solution est élevé, plus la solution est acide.
24. Fra	ançois mesure le pH d'une solution. Il note que le pH-mètre indique 3.
a)	La solution est-elle acide, basique ou neutre ? Expliquez votre réponse.
b)	Il décide de la diluer en mélangeant 10 ml de la solution avec 90 ml d'eau. Quel sera le nouveau pH de la solution ? Expliquez votre réponse.
25. Isa	abelle veut préparer 500 ml d'une solution dont le pH est de 11 à partir d'une solution
со	ncentrée dont le pH est de 13. Comment devra-t-elle s'y prendre ?

