

## Шкала с лицами для оценки боли – Обновленная (FPS-R)

В приведенных ниже инструкциях употребляйте слова "болит" или "боль" в зависимости от того, что конкретный ребенок воспринимает как правильное.

"Эти лица показывают, насколько сильно что-то может болеть. Это лицо [укажите на лицо, показывающее, что боли нет, крайнее лицо слева от ребенка] показывает, что **ничего не болит**. Лица показывают все более сильную боль [укажите на каждое из них в направлении слева направо] до этого [укажите на лицо, показывающее самую сильную боль, крайнее лицо справа от ребенка] – оно показывает **очень сильную боль**. Укажи, какое из этих лиц, показывает, как сильно тебе больно [сейчас]"

Определите балльную оценку боли по избранному лицу **0, 2, 4, 6, 8** или **10**, считая слева направо, при этом "0" = "боли нет", а "10" = "очень сильная боль". Не используйте слов вроде "радостный" и "грустный". Эта шкала предназначена для количественной оценки того, что дети чувствуют внутри, а не того, что выражают их лица.

**Разрешение на использование.** Авторские права на шкалу FPS-R принадлежат International Association for the Study of Pain (IASP) © 2001. Этот материал разрешается фотокопировать для использования в **некоммерческих клинических, образовательных и исследовательских** целях. Прежде чем воспроизводить шкалу FPS-R в журнале, книге, на веб-странице или для любых коммерческих целей, обратитесь за разрешением к IASP через интернет [www.iasp-pain.org/FPS-R](http://www.iasp-pain.org/FPS-R).

**Источники.** Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford P, van Korlaar I, Goodenough B. The Faces Pain Scale – Revised: Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain 2001;93:173-183. Bieri D, Reeve R, Champion GD, Addicoat L, Ziegler J. The Faces Pain Scale for the self-assessment of the severity of pain experienced by children: Development, initial validation and preliminary investigation for ratio scale properties. Pain 1990;41:139-150.

(согните по пунктирной линии)

10

8

6

4

2

0

