

Requisitos estatales mínimos de Texas de vacunación neumocócica (PCV-7, Prevnar™) para niños que asistan a guarderías

I. Orientación para guarderías y escuelas

Instrucciones para leer el gráfico: cuando un niño se presente en una guardería, un programa de la primera infancia o un programa prekindergarten, el individuo que revise el archivo de vacunación de dicho niño debe: 1) determinar la edad del niño y 2) determinar la edad del niño cuando se administró la primera dosis y 3) determinar el número de dosis que se requieren para que el niño asista. La edad del niño cuando se administró la primera dosis afecta el número total de dosis que se requiere que el niño tenga.

<u>EDAD DEL NIÑO</u>	<u>REQUISITO DE VACUNACIÓN</u>
2 meses a 3 meses	Una dosis de la vacuna neumocócica
4 meses a 5 meses	Dos dosis de la vacuna neumocócica
6 meses a 11 meses	Tres dosis de la vacuna neumocócica O BIEN Dos dosis si el niño recibió la primera dosis de la vacuna neumocócica de los 7 meses a los 11 meses de edad
12 meses a 23 meses	Cuatro dosis de la vacuna neumocócica con una dosis a los 12 meses de edad o después O BIEN Tres dosis si el niño recibió la primera dosis de la vacuna neumocócica de los 7 meses a los 11 meses de edad, y si se administró al menos una dosis a los 12 meses de edad o después O BIEN Dos dosis si el niño recibió la primera dosis de la vacuna neumocócica de los 12 meses a los 23 meses de edad
24 meses a 59 meses	Una dosis si el niño no está vacunado o está parcialmente vacunado y sano O BIEN Si el niño no está vacunado o está parcialmente vacunado y en alto riesgo*, se requieren dos dosis

*Los médicos determinarán si un niño corre alto riesgo y lo vacunarán como corresponda.

II. Orientación para médicos, enfermeros titulados y demás proveedores de vacunas

Se le recuerda que las recomendaciones anteriores son coherentes con las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (AAP) (Redbook 2003) y del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) cuando no hay escasez (MMWR 2004; 53: 851). Dado que los niños que asisten a guarderías fuera del hogar corren riesgo moderado de contraer la enfermedad neumocócica invasiva, el estado de Texas requiere que los individuos sanos de 24-59 meses de edad que no han recibido ninguna dosis de PCV-7 con anterioridad, reciban 1 dosis antes de que asistan a la guardería a partir del 1 de septiembre de 2005. Dicha recomendación la ofrece la AAP en Redbook y el consejo de "considerar" a la PCV-7 para dicho grupo lo publica el ACIP en el MMWR. Sírvase consultar los recursos anteriores (Redbook, MMWR) y otros sitios web (AAP, TPS) para informarse más a fondo sobre la definición de las enfermedades médicas de alto riesgo, los intervalos mínimos entre dosis, los calendarios modificados cuando haya escasez de la vacuna y el uso de la vacuna neumocócica polisacárida 23-valente (Pneumovax®) en niños de 24-59 meses de edad con enfermedades de alto riesgo. **Si los proveedores han estado siguiendo las recomendaciones de la AAP/el ACIP, es muy probable que sus pacientes satisfagan dichos requisitos de ingreso a guarderías.**



Texas Department of State Health Services • Immunization Branch • P O Box 149347 • Austin, TX 78714-9347 • (800) 252-9152